



## UNE PRISE EN CHARGE EST ACCORDÉE POUR 2 CONSULTATIONS

Suite à l'avenant 5, à la convention nationale des pédicures podologues une prise en charge est accordée pour 2 consultations pendant un traitement anti-cancéreux uniquement **sur prescription de l'oncologue**.

## DANS LE CADRE DES TRAITEMENTS CONTRE LE CANCER, LES PIEDS PEUVENT ÊTRE PLUS OU MOINS IMPACTÉS.

Le pédicure podologue peut intervenir en dressant un bilan qui permettra d'évaluer et donner des conseils adaptés à l'état des pieds avant le début du traitement si besoin. Il effectue aussi des soins pendant le traitement. Il informe le médecin et/ou l'oncologue en cas d'effets secondaires trop sévères et ce dernier décidera de la réévaluation du traitement.

- Soins de **pédicurie** adaptés
- Conseils de **soins et d'entretien**
- Conseils de **chaussage et de chaussettes**
- **Bilan podologique avec orthèses** si nécessaire
- **Confection d'orthoplasties**  
(orthèse amovible sur mesure pour protéger ou décharger un ou plusieurs orteils)
- **Confection d'onychoplasties**  
(confection en résine médicale pour protéger l'ongle abîmé)



**L'URPS DES PÉDICURES PODOLOGUES CENTRE VAL DE LOIRE A SOUHAITÉ METTRE EN PLACE UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION POUR LES EFFETS SECONDAIRES DES TRAITEMENTS ONCOLOGIQUES ET ORIENTER LES PATIENTS CONCERNÉS VERS LES PÉDICURES PODOLOGUES AFIN DE LES ACCOMPAGNER ET LES SOULAGER.**



Ce projet a pu être réalisé grâce à la **Fédération des URPS** qui a soutenu cette action et accompagné le déploiement auprès du public et des professionnels de santé.



La Fédération des URPS a signé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec **l'ARS** pour le financement de cette campagne.

+D'INFOS

**URPS-PODOLOGUES-CVL.FR**



## ONYCHOLYSE



C'est une atteinte de la tablette unguéale entraînant un décollement partiel ou total d'un ou plusieurs ongles des pieds.

**i** ATTENTION : souvent confondue avec une mycose unguéale.

### IL EXISTE 2 GRADES

**Grade 1** ● ● Séparation du lit et de la plaque unguéale ou chute de l'ongle asymptomatique.

**Grade 2** ● ● ● Séparation du lit et de la plaque unguéale ou chute de l'ongle douloureux et impactant la vie quotidienne.

### LES CONSEILS DU PÉDICURE PODOLOGUE

— **Soins** : ablation de la partie décollée de l'ongle et fraisage modéré, protocole de soin si lésion unguéale

— **Chaussures** : larges et/ou ouvertes

— **Chaussettes** : pas de coutures, bas de contention ouvert

— **Orthèses** : onychoplastie

## SYNDROME MAIN-PIED



Le syndrome main pied touche les mains et/ou les pieds de façon bilatérale, siégeant sur la totalité de la face plantaire du pied (syndrome diffus) et sur des points de pression (syndrome localisé).

Il se caractérise par des **paresthésies** entraînant des sensations de **brûlures** et de **fourmillements**, une peau sèche avec apparition possible de **crevasses**, une peau lésée par des **phlyctènes**. Ces paresthésies peuvent entraîner des douleurs, des instabilités à la marche, et des difficultés de chaussage.

### IL EXISTE 3 GRADES

**Grade 1** ● ● ● Modification légère de la peau sans douleur.

**Grade 2** ● ● ● Apparition d'érythèmes ou d'hyperkératoses avec douleurs sans impact sur les gestes du quotidien.

**Grade 3** ● ● ● Érythèmes ou hyperkératoses importants avec douleurs inflammatoires invalidantes sur les gestes du quotidien.

## PARONYCHIES



C'est une inflammation douloureuse du pourtour de l'ongle, avec ou sans la présence d'un bourgeon charnu, associée à un ongle fragilisé

**i** ATTENTION : souvent confondu avec un ongle incarné.

### IL EXISTE 3 GRADES

**Grade 1** ● ● ● Erythème du pourtour de l'ongle.

**Grade 2** ● ● ● Inflammation du pourtour de l'ongle, érythème douloureux sans impact sur les gestes du quotidien.

**Grade 3** ● ● ● Inflammation risquant de s'infecter, nécessitant un avis médical et pouvant entraîner un geste chirurgical.

### LES CONSEILS DU PÉDICURE PODOLOGUE

— **Soins** : coupe d'ongles et fraisage.

— **Dans le grade 1**, assèchement du pourtour de l'ongle et surveillance de l'état péri-unguéal.

— **Orthèses** : réalisation d'un padding pour limiter la compression entre deux orteils, réalisation d'une orthoplastie de décharge.